

Les Reptiles de l'Île-de-France

SQUAMATES

oui Carapace non

TORTUES (Chéloniens)

Une carapace, un bec et des pattes griffues.

Paupières mobiles et ventre avec plusieurs rangées d'écailles

non

Serpents (Ophidiens)

Paupières soudées en une lunette : l'iris est toujours visible ; ventre avec une seule rangée d'écailles

Lézards (Lacertiliens)

Les paupières sont mobiles : l'oeil se ferme. Ventre avec plusieurs rangées d'écailles


non

Pattes

oui



L'orvet fragile *Anguilla fragilis* Linnaeus, 1758. Mâle gris marron homogène. Nouveau-né or avec une bande verticbrale noire. Jeune et femelle avec les flancs marron foncé. Adulte atteignant 40 cm.



Le lézard vert occidental *Lacerta bilineata* (Laurenti, 1768). La rostrale touche la narine. Écaille occipitale plus longue que large. Plus de 13 pores fémoraux par cuisse. Jeune et femelle verts lignés sur le dos et les flancs. Mâle vert perlé de noir, gorge bleuté au printemps. Adulte atteignant 30 cm.



Le lézard des souches *Lacerta agilis* Linnaeus, 1758. La rostrale sans contact avec la narine. Écailles du milieu du dos rétrécies. Moins de 13 pores fémoraux par cuisse. Jeune brun uni à points blancs. Femelle marron, mâle à flancs verts. Deux bandes dorsales. Atteint 20 cm.



Le lézard vivipare *Zootoca vivipara* (Jacquin, 1787). Queue carénée. Collier dentelé. 5 à 15 pores fémoraux par cuisse. Adulte marrons et lignés. Tête courte. Atteint 15 cm.



Le lézard des murailles *Podarcis muralis* (Laurenti, 1768). Queue lisse. Collier régulier. 13 à 25 pores fémoraux. Adulte gris. Mâle avec le dos et les flancs réticulés. Tête longue. Atteint 20 cm.



La couleuvre à collier *Natrix natrix helvetica* Lacépède, 1789. Dos uniforme gris. Ventre noir et blanc. Collier jaune et noir, s'atténuant avec l'âge. Femelle atteignant 130 cm. Formule 1.3.1.



La couleuvre vipérine *Natrix maura* (Linnaeus, 1758). Dos brun avec des zigzags noirs. Ventre noir et jaune pâle. Atteint 90 cm. Formule 1.2.2.



Couleuvres d'eau

1 Nombre d'écailles temporales

2

Écailles du dos carénées

Couleuvres terrestres

non

masque de Zorro

oui




La couleuvre d'Esculape *Zamenis longissimus* (Laurenti, 1768). Jeune avec un collier jaune. Adulte : dos vert olive ponctué de blanc et ventre jaune pâle uni. Atteint 160 cm. Formule 2.2.1.



La couleuvre verte-et-jaune *Hierophis viridiflavus* (Lacépède, 1789). Jeune : tête bariolée de jaune et corps uni. Adulte : dos noir et jaune, ventre jeune pâle. Vers les 200 cm. Formule 2.2.2.



La coronelle lisse *Coronella austriaca* Laurenti, 1768. Labiales 3 et 4 touchant l'oeil. Ventre brun uniforme. Formule 2.2.1.



Jaune : écaille inguinale
Orange : plastron



La tortue de Floride *Trachemys scripta* (Schœpfl., 1792). Joues rouges à orangées. Lignes jaunes. Espèce introduite suite aux importations des nouveaux animaux de compagnie.




La cistude d'Europe *Emys orbicularis* (Linnaeus, 1758). Coloration foncée avec le corps ponctué de jaune. Pas d'écaille inguinale.



L'émyle lépreuse *Mauremys leprosa* (Schweigger, 1812). Coloration uniforme. Écaille inguinale (i.) présente. Sud-ouest de la France.

Pupille verticale, petites écailles sur la tête et plusieurs rangées d'écailles entre la bouche et l'oeil : vipères sinon...

Vipères




l, labiale



La vipère aspic *Vipera aspis aspis* (Linnaeus, 1758). Bout du museau retroussé. Petites écailles entre les yeux. 3 rangées d'écailles entre l'oeil et la bouche. Iris jaune. Couleur très variable. Atteint 70 cm.

Pupille arrondie, grandes écailles sur la tête et une seule rangée d'écailles entre la bouche et l'oeil : couleuvres

Couleuvres



t, temporale
l, labiale



La vipère péliade *Vipera berus* (Linnaeus, 1758). Bout du museau arrondi. Grandes écailles entre les yeux. 2 rangées d'écailles entre l'oeil et la bouche. Iris brun. Mâle gris et femelle brune. Atteint 70 cm.